

PŘÍPRAVA PACIENTA K REKTOSKOPII A SIGMOIDEOSKOPII

KLYSMA SALINICKÉ 135ml

(volně prodejné)



Klystýr k výplachu. K rychlému vyprázdnění stolice z dolní části střeva a konečníku.

Aplikujte 2 kusy hned po sobě do konečníku 2 hodiny před vyšetřením.

NE DŘÍVE!

Není třeba žádné dietní opatření, jezte i pijte dle svých zvyklostí.
Nepoužívejte k přípravě ani Guttalax, ani Glycerinové čípky!!
Příprava je pak nedostatečná a vyšetření se musí opakovat!

PŘÍPRAVA PACIENTA K REKTOSKOPII A SIGMOIDEOSKOPII

Yal gel (na lékařský předpis)



Klystýr k výplachu. K rychlému vyprázdnění stolice z dolní části střeva a konečníku.

Aplikujte 2 kusy hned po sobě do konečníku 2 hodiny před vyšetřením.

NE DŘÍVE!

Není třeba žádné dietní opatření, jezte i pijte dle svých zvyklostí.
Nepoužívejte k přípravě ani Guttalax, ani Glycerinové čípky!!
Příprava je pak nedostatečná a vyšetření se musí opakovat!