

Tuberkulinová zkouška s použitím neregistrovaného léčebného prostředku PPD Tuberculinu Mammalian

Pacient (štítek):

Jméno a příjmení:.....

Rodné číslo:.....

Bydliště:..... PSČ:

Zákonný zástupce:

Jméno a příjmení:.....

Rodné číslo:.....

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče,

v předkládaném formuláři si přečtete informace o tuberkulinové zkoušce. Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.

Co je tuberkulinová zkouška:

Tuberkulinová zkouška je nitrokožní injekce tuberkulinu s odečtem zduření podkoží za 72 hodin.

Co je Tuberkulin:

Tuberkulin je látka určená k diagnostice.

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:

Důvodem tuberkulinové zkoušky je určení obranyschopnosti organismu proti tuberkulóze, nebo případně určení diagnózy a určení možnosti provedení očkování proti tuberkulóze.

Jaký je režim pacienta před výkonem:

Před výkonem nejsou zvláštní opatření.

Pokud Vám byla podána inaktivovaná vakcína očkovací, tak lze tuberkulinovou zkoušku provést až za 2 týdny po jejím podání, případně za 4 týdny po podání živé očkovací vakcíny. Tuberkulinovou zkoušku nelze provést u pacientů léčených adrenokortikotropním hormonem, imunosupresivními léky, u pacientů s adrenokortikální dysfunkcí, akutní virovou nákazou (jako spalničky, příušnice včetně aktuálního očkování proti těmto nálezům), u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

Jaký je postup při provádění výkonu:

Tuberkulinová zkouška se provádí standardním tuberkulinem, který se jehlou podává do povrchové vrstvy kůže levého předloktí. Výsledek zkoušky se odečítá za 72 hodin po podání, přičemž se hodnotí zduření podkoží v milimetrech.

Jaké jsou možné komplikace a rizika:

Bezprostředně po injekci se mohou někdy objevit bolest, podráždění, svědění nebo nepříjemný pocit v místě vpichu. Je zde velmi malé riziko zarudnutí a otoku paže. U osob s mimořádnou citlivostí se v místě vpichu mohou objevit puchýřky nebo nekróza. Hlášeny byly i zvýšená teplota nebo zduření lymfatických uzlin. Tyto komplikace jsou v naprosté většině přechodné.

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:

Po provedení tuberkulinové zkoušky se dostavíte na kontrolu za 72 hodin k odečtu výsledku zkoušky. Datum a hodinu kontroly určí kalmetizační sestra.

Režim po provedení tuberkulinové zkoušky je bez dalších opatření.

Očkování proti jiným virovým nebo bakteriálním nákazám lze provést za 1 týden po provedení tuberkulinové zkoušky.

Jaké jsou možné alternativy výkonu:

Samotná tuberkulinová zkouška nemá alternativu. V některých případech může být nahrazena provedením krevního – Quantiferon TB Gold testu.

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat.

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Datum:

Podpis pacienta nebo zákonného zástupce

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího lékaře, který vysvětlující pohovor provedl

Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): popište způsob:

Jméno, příjmení a podpis svědka

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře